

## INDICATEURS DU MILLÉNAIRE, EDSN-MICS III NIGER 2006

Objectif	Indicateur	Valeur	
1. Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale	Masculin : 45,0 % Féminin : 43,8 %	Ensemble : 44,4 %
2. Assurer l'éducation primaire pour tous	Taux net de scolarisation dans le primaire <sup>1</sup>	Masculin : 43,4 % Féminin : 30,3 %	Ensemble : 36,9 %
	Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans <sup>2</sup>	Masculin : 27,8 % Féminin : 11,6 %	Ensemble : 16,1 %
3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire et secondaire	Primaire : 0,66 Secondaire : 0,63	
	Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des hommes <sup>2</sup>		0,42
4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans	Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)		198 pour 1 000
	Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)		81 pour 1 000
	Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole	Masculin : 46,6 % Féminin : 47,4 %	Ensemble : 47,0 %
5. Améliorer la santé maternelle	Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)		648 pour 100 000
	Proportion d'accouchements assistés par du personnel formé		32,9 %
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies	Utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel à risque (population âgée de 15 à 24) <sup>3</sup>	Masculin : 37,2 % Féminin : (17,8 %)	
	Population âgée de 15 à 24 ans ayant une bonne connaissance générale du VIH/sida <sup>4</sup>	Masculin : 18,6% Féminin : 12,6 %	
	Taux d'utilisation de la contraception (une méthode moderne, femmes 15-49 actuellement en union)		5,0 %
	Parmi les femmes de 15-49 ans en union qui utilisent une méthode moderne de contraception, pourcentage qui utilisent le condom		0,0%
7. Assurer un environnement durable	Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d'eau meilleure <sup>5</sup> , zones urbaine et rurale	Urbain : 93,0 % Rural : 30,8 %	Ensemble : 41,4 %
	Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d'assainissement <sup>6</sup> , zones urbaine et rurale	Urbain : 38,4 % Rural : 2,2 %	Ensemble : 8,4 %

<sup>1</sup> Non compris les enfants dont le statut des parents est manquant.

<sup>2</sup> Correspond aux enquêtés qui ont, au moins, fréquenté l'école secondaire et à ceux pouvant lire une phrase entière en français, en Haoussa ou en Songhai/Djerma. La lecture des autres langues nationales et l'alphabet arabe n'est pas pris en compte.

<sup>3</sup> On entend par rapports sexuels à hauts risques, les rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.

<sup>4</sup> Sont considérés comme ayant une bonne connaissance générale, les femmes et les hommes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida. Les deux idées erronées les plus courantes sont la transmission par les piqûres de moustiques et le fait de partager les repas avec une personne infectée.

<sup>5</sup> Eau de robinet, forage ou puits protégés.

<sup>6</sup> Chasse d'eau, fosse/latrines non couvertes, fosse/latrines couvertes ou fosse/latrines ventilée améliorées.